

vertissements
agricoles
uvergne
Grandes
Cultures

Bulletin technique N° 5 du 16/05/95
Supplément N° 1

BLE**Maladies : Intervenir contre Septoriose et Rouille brune****Pucerons : Attendre****TOURNESOL****Pucerons : A surveiller****BETTERAVES****Pucerons : Assurer une bonne protection****COLZA****Pucerons cendrés : Vigilance****BLE**

Stades (Gonflement : 9 - 10
) Début épiaison : 10-1 à 10-3

MALADIES❖ **Situation**

- **Septoriose** : Plus fréquente dans l'Allier avec une pression plus forte en Sologne, Bocage ainsi qu'en Forterre et plus ponctuellement en Val d'Allier (semis d'Octobre) où des symptômes sont bien souvent présents sur F3. Dans les autres milieux (notamment en Limagne) celle-ci est peu présente.

INFO PRESEPT

Allier (semis précoces) : "Top" climatique atteint depuis début Mai. Stagnation du risque durant une semaine. Redépart en cours.

Allier (semis tardifs) : Amorce d'un risque moyen. Prudence dans 8 jours.

Puy-de-Dôme - Haute-Loire : Risque toujours bas.

- **Rouille brune** : En évolution. Attention dès la prochaine période de chaleur. Pustules assez nombreuses particulièrement dans le Puy-de-Dôme (secteurs : MARINGUES, JOZE, PONT-DU-CHATEAU, LEMPDES, MEZEL, LUZILLAT...) et aussi encore faiblement en Limagne. Dans l'Allier : maladie discrète (secteurs LA FERTE-HAUTERIVE, NEUVY, MONTOLDRE...)

- **Oïdium** : Stationnaire.

★ Préconisation

Soyez très vigilant.

Intervenir rapidement en fonction de l'évolution de la Septoriose (plus particulièrement dans l'Allier) et de la Rouille brune (plus particulièrement dans le Puy-de-Dôme) afin de protéger correctement les 2 feuilles supérieures (F1 et F2) et l'épi.

Tenez compte des indications de Présept, mais surtout soyez observateur dans chacune de vos parcelles (prélever et noter le niveau d'attaque de chaque maladie) afin de prendre en toute connaissance de cause votre décision.

Seuils :

. Rouille brune : Détection des premières pustules sur F3, F2 et F1.

. Septoriose : 10 % des F3 touchées.

Choisir le fongicide le plus adapté (une triazole haut de gamme). Consulter le dépliant vert SPV-ITCF (vert foncé).

PUCERONS

Soyez vigilant dès l'épiaison uniquement.

Seuils d'intervention : un épi sur deux colonisé.

Pas de traitement insecticide pour l'instant.

JAUNISSEMENT DU BLE

Plusieurs parcelles présentent des jaunissement sérieux associés à un nanisme. Des analyses sont en cours (viroses de type JNO, mosaïques ?...).

Nous communiquer vos observations en cas de problèmes sur votre exploitation.

TOURNESOL

Stade) Levée à 2 - 3 paires de feuilles

PUCERONS

★ Situation

Pas de pucerons en cultures pour l'instant

★ Préconisation

Surveiller vos parcelles dès maintenant, particulièrement celles n'ayant pas été protégées dès le semis avec GAUCHO.

La nuisibilité du puceron vert (*Brachycaudus helichrysi*) est plus importante aux stades jeunes.

Seuils : Avant B5 : 30 à 50 pucerons par plante.

BETTERAVES

PUCERONS ET VIROSES

✪ Situation

Les captures en bacs jaunes s'amplifient.

Tous les pucerons vecteurs sont présents (activité forte entre le 7 et le 12 Mai).

Les premières colonies sont visibles en cultures.

✪ Préconisation

Assurer une bonne protection aphicide sur les parcelles sans insecticide au semis et celles traitées avec COUNTER ou CURATER (rémanence de 30 jours).

COLZA

PUCERONS CENDRES

✪ Situation

Présence localement. Colonisation parfois fréquente des bordures avec ponctuellement des attaques vers l'intérieur.

✪ Préconisation

Seuils d'intervention : 2 colonies/m².